

## **Becutan KIDS VITS protiv kolika oralne kapi**

**Proizvod na bazi sljedećih sastojaka:** simetikon u maslinovom ulju, vitamin A, vitamin E i koenzim Q<sub>10</sub>.

### **Terapijske indikacije**

**Becutan KIDS VITS protiv kolika** medicinski je proizvod indiciran za liječenje u sljedećim slučajevima:

- nadutost i kolike uzrokovane plinovima u dojenčadi, djece i odraslih,
- gastrointestinalni vjetrovi,
- dispeptički poremećaji.

### **Doziranje i način primjene**

**Jedna doza:** 20 kapi proizvoda **Becutan KIDS VITS protiv kolika** sadrži 40 mg simetikona.

**Odrasli:** 20 – 40 kapi, po želji razrijeđenih u tekućini i po mogućnosti nakon obroka, 2 – 4 puta dnevno ili prema liječničkom savjetu.

**Djeca:** 20 kapi, po želji razrijeđenih u tekućini i po mogućnosti nakon obroka, 1 – 3 puta dnevno ili prema liječničkom savjetu.

**Dojenčad:** 20 kapi, po želji razrijeđenih u tekućini i po mogućnosti nakon obroka, 1 – 2 puta dnevno ili prema liječničkom savjetu.

### **Upute za upotrebu**

Bočicu dobro protresti prije upotrebe. Čvrsto zatvoriti bočicu nakon upotrebe.

### **Način čuvanja**

Čuvati na sobnoj temperaturi. Čuvati proizvod čvrsto zatvoren i podalje od izvora topline. Proizvod se može upotrebljavati najdulje 30 dana nakon otvaranja.

### **Upozorenja**

Nema posebnih mjera opreza za upotrebu proizvoda.

Međutim, obratite pažnju na sljedeće:

- Sadržaj proizvoda se može razdvojiti na dvije odvojene faze. Proizvod bi nakon miješanja trebao postati homogena emulzija.
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Preporučene doze ne smiju se prekoračiti.
- Proizvod se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti. Rok valjanosti odnosi se na neotvoren i ispravno pohranjen proizvod.
- Proizvod se ne smije upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno.
- Svi dijelovi od kojih se sastoji proizvod, uključujući kapaljku, moraju biti neoštećeni.
- Ako nakon kratkog razdoblja liječenja (7 dana) nema značajnih rezultata, posavjetujte se s liječnikom.

- Proizvod se ne smije upotrebljavati dulje od 30 dana.
- U slučaju neželjenih učinaka prekinite s upotrebom proizvoda i posavjetujte se s liječnikom kako bi se utvrdila odgovarajuća terapija.
- Ako tijekom upotrebe posumnjate na slučajnu kontaminaciju kapaljke, pažljivo je operite prije nego što je vratite u bočicu kako bi se spriječila daljnja kontaminacija.
- Pridržavanjem ove upute za upotrebu smanjuje se opasnost od neželjenih učinaka.
- Važno je da se posavjetujete s liječnikom ili ljekarnikom ako se pojave neželjeni učinci koji nisu opisani u ovoj uputi za upotrebu.
- Proizvod se ne smije upotrebljavati ako postoji sumnja na puknuće crijevne stijenke uključujući i ono kod ileusa.

### **Kontraindikacije**

Ne upotrebljavati u slučaju reakcija preosjetljivosti na sastojke proizvoda.

### **Interakcije i nekompatibilnosti**

Nisu poznate interakcije proizvoda s ostalim lijekovima.

Nisu prijavljene nekompatibilnosti s drugim farmaceutskim proizvodima. Međutim, u literaturi je dokumentirano izvješće o slučaju interakcije simetikona i levotiroksina. Stoga se u slučaju istodobne terapije lijekovima na bazi levotiroksina posavjetujte s liječnikom prije upotrebe proizvoda **Becutan KIDS VITS protiv kolika**.

### **Trudnoća i dojenje**

**Trudnoća:** nema odgovarajućih podataka o upotrebi ovog proizvoda u trudnica te se ne bi trebao upotrebljavati osim u slučaju da je to istinski nužno i to nakon procjene liječnika.

**Dojenje:** nije poznato izlučuje li se simetikon u majčino mlijeko te se proizvod ne bi trebao upotrebljavati osim u slučaju da je to istinski nužno i to nakon procjene liječnika.

**Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima:** nema prijavljenih učinaka na sposobnost upravljanja vozilima.

### **Neželjeni učinci i predoziranje:**

Kao i u slučaju svih proizvoda na bazi simetikona, ovaj medicinski proizvod može uzrokovati neželjene učinke, iako se neće pojaviti u svih osoba.

Obavijestite Vašeg liječnika ako tijekom liječenja proizvodom **Becutan KIDS VITS protiv kolika** zamijetite sljedeće neželjene učinke:

- povraćanje, proljev, bol u trbuhu, bol u ileumu, mučninu;
- osip;
- oticanje na licu, očima i usnama ili oticanje grla koje otežava disanje (angioedem).

Ovi se neželjeni učinci rijetko pojavljuju. Nisu prijavljeni učinci predoziranja.

### **Opis proizvoda**

**Becutan KIDS VITS protiv kolika** medicinski je proizvod klase IIa koji se prodaje u bočicama od 30 ml s kapaljkom u kojima se nalazi uljna otopina simetikona.

## **Zbrinjavanje**

Proizvod kojemu je istekao rok valjanosti mora se zbrinuti sukladno nacionalnim propisima o gospodarenju otpadom. Ni u kojem slučaju nemojte baciti proizvod ni njegovu ambalažu u okoliš.

**Datum posljednje revizije teksta:** kolovoz 2017.

**Datum posljednje revizije upute za upotrebu:** veljača 2020.



**SIIT srl**  
**Via Ariosto 50/60**  
**20090 Trezzano sul Naviglio (MI), ITALIJA**

**Distributer:** \_\_\_\_\_

